



Hřížení

Na jednu společnou dílnu, která se konala u Vaška Nováka v Libochovicích, jsem si s sebou vzal pro posouzení stromek *Zelkova serrata*. Zajímal mě názor lektora i ostatních účastníků setkání, zda má vůbec tato rostlina nějakou bonsajovou perspektivu.

Po konzultaci s lektorem, kterým byl právě Juraj Marcinko ze Švýcarska, jsme došli k závěru, že spodní část koruny je těsně pod obrostem nepěkně zesílená a na místě dřívějšího růstu silných větví vznikly jejich odřezáním

nezhojitelné rány na kmeni. *Zelkova* byla už jednou hřížena, a to jako dvoumetrový strom rostoucí na mé zahradě. Nyní jsem se tedy snažil dát co nejideálnější bonsajovou podobu tomuto zahříženému vrcholu. Jak je vidět z obrázků, při respektování doby a techniky prací je *zelkova* ideálním stromem pro podobné zásahy.

Doporučeným postupem získala zcela jiný tvar a přitom byly odstraněny její bývalé nepřekonatelné handicap.

1. Zahřížený vrchol původně dvoumetrového stromu, který rostl na mé zahradě.

Na obrázku jsou patrné nedostatky takto zapěstované rostliny: zesílení kmene pod korunou i nezhojitelné rány po odstranění silných větví.





2. Juraj Marcinko doporučil hřížit rostlinu právě v místě nežádoucího zesílení tedy těsně pod její korunou. Místo řezu je naznačeno křídou.

3. Na obrázku je dobře viditelné provedení zářezu, 4 mm širokého, hlubokého až na dřevo rostliny.



4. Pro rychlejší růst kořenů je dobré ošetřit po řezu ránu stimulatorem.



5. Potom následuje zaškrcení místa hřížení měděným drátem (5mm).

6. Ránu obalíme mechem a nádobu přiloženou v místě zákroku vyplníme čistou akadámou. Povrch substrátu je pokryt mechem, aby nedocházelo k nežádoucímu odparu vody. Substrát je dobré udržovat rovnoměrně stále vlhký.



7. 8. Popisovaný zákrok jsem provádět 12. dubna 2004. Další snímky jsou z července téhož roku, kdy na letní výstavě v Libochovicích byla horní část stromu - jeho koruna - oddělena a zasazena do samostatné misky. V té době již měla tato zahrzená část dostatečně vyvinuté kořeny. Byla tedy odstraněna nádoba i drát a celý stromek nově vzniklý z vrchní části koruny bývalé rostliny byl zasazen opět do akadamy.



9. Zbytek kmene byl z boku orubován, ačkoli jsme věděli, že termín pro roubování je nevhodný a výsledek této práce tedy nejistý.



10. 11. Další snímky ukazují zelkovu na konci července, kdy už je patrné, že obě části stromku dále pokračují v růstu, i když rouby musely být odstraněny, protože zaschly.

